

# Про моногенні функції на розширеннях комутативної алгебри

В. С. Шпаківський

**Abstract.** A relation between spatial potential fields and analytic functions given in commutative algebras was established by P. W. Ketchum who has shown that every analytic function  $\Phi(\zeta)$  of the variable  $\zeta = xe_1 + ye_2 + ze_3$  satisfies the equation

$$\Delta_3 u(x, y, z) := \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) u(x, y, z) = 0$$

in the case where the elements  $e_1, e_2, e_3$  of a commutative algebra satisfy the condition

$$e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 = 0,$$

because

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} \equiv \Phi''(\zeta) (e_1^2 + e_2^2 + e_3^2) = 0,$$

where  $\Phi'' := (\Phi')'$  and  $\Phi'(\zeta)$  is defined by the equality  $d\Phi = \Phi'(\zeta)d\zeta$ .

I. P. Mel'nichenko noticed that doubly differentiable in the sense of Gateaux functions form the largest algebra of functions  $\Phi$  satisfying identically the above equalities, where  $\Phi''$  is the Gateaux second derivative of function  $\Phi$ .

It is proved in [1] that for constructing solutions of the equation

$$\sum_{\alpha+\beta+\gamma=N} C_{\alpha,\beta,\gamma} \frac{\partial^N U}{\partial x^\alpha \partial y^\beta \partial z^\gamma} = 0, \quad C_{\alpha,\beta,\gamma} \in \mathbb{R}.$$

in the form of components of monogenic functions with values in finite-dimensional commutative associative algebras it suffices to confine itself to studying monogenic functions in algebras of a certain type, that is, in algebras  $\mathbb{A}_n$ .

For  $n$ -dimensional ( $2 \leq n < \infty$ ) commutative associative algebra  $\mathbb{A}_n$  we introduce a concept of *expansion* as a set of  $(n+1)$ -dimensional commutative associative algebras with certain multiplication rules. A relation between monogenic (continuous and differentiable in the sense of Gateaux) functions

---

Робота виконана при підтримці Міністерства освіти і науки України (проект № 0116U001528).

2010 Mathematics Subject Classification: 30G35, 57R35

Ключові слова: commutative associative algebra, monogenic function, expansion of algebra

in the algebra  $\mathbb{A}_n$  and monogenic functions that defined on expansions of  $\mathbb{A}_n$  is established. For the equation above it will mean the following: if its complex-valued solution  $U(x, y, z)$  is a component of monogenic function in the algebra  $\mathbb{A}_n$  for  $n < N$ , then there exists the algebra of the form  $\mathbb{A}_N$  and there exists a monogenic function  $\Phi$  in  $\mathbb{A}_N$  such that  $U(x, y, z)$  is a component of the function  $\Phi$ . The results obtained in this paper hold for the equations of the above type of  $d$  variables for all integer  $2 \leq d \leq 2N$ .

**Анотація.** Для  $n$ -вимірної ( $2 \leq n < \infty$ ) комутативної асоціативної алгебри  $\mathbb{A}_n$  введено поняття *розширення* як сімейства  $(n+1)$ -вимірних комутативних асоціативних алгебр з певними правилами множення. Встановлено зв'язок між моногенними (неперервними і диференційовними за Гато) функціями в алгебрі  $\mathbb{A}_n$  і моногенними функціями, визначеними на розширеннях алгебри  $\mathbb{A}_n$ .

## 1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Ідея про побудову розв'язків заданих диференціальних рівнянь в частинних похідних у вигляді компонент аналітичних функцій в комутативних алгебрах знаходить свій початок ще в роботі П. Кетчума [3]. Він використав аналітичні функції зі значення в комутативній алгебрі для побудови розв'язків тривимірного рівняння Лапласа.

Узагальнюючи П. Кетчума, М. Рошкулець [7], [8] використовував аналітичні функції зі значеннями в комутативних алгебрах для дослідження рівнянь вигляду

$$\mathcal{L}_N U(x, y, z) := \sum_{\alpha+\beta+\gamma=N} C_{\alpha,\beta,\gamma} \frac{\partial^N U}{\partial x^\alpha \partial y^\beta \partial z^\gamma} = 0, \quad C_{\alpha,\beta,\gamma} \in \mathbb{R}. \quad (1.1)$$

Розглядаючи змінну  $\zeta = xe_1 + ye_2 + ze_3$  і аналітичну функцію  $\Phi(\zeta)$ , отримуємо наступну рівність для мішаної похідної:

$$\frac{\partial^{\alpha+\beta+\gamma} \Phi}{\partial x^\alpha \partial y^\beta \partial z^\gamma} = e_1^\alpha e_2^\beta e_3^\gamma \Phi^{(\alpha+\beta+\gamma)}(\zeta) = e_1^\alpha e_2^\beta e_3^\gamma \Phi^{(N)}(\zeta). \quad (1.2)$$

Підставляючи (1.2) в рівняння (1.1), маємо рівність

$$\mathcal{L}_N \Phi(\zeta) = \Phi^{(N)}(\zeta) \sum_{\alpha+\beta+\gamma=N} C_{\alpha,\beta,\gamma} e_1^\alpha e_2^\beta e_3^\gamma,$$

яка показує, що для виконання рівності  $\mathcal{L}_N \Phi(\zeta) = 0$  елементи алгебри  $e_1 = 1, e_2, e_3$  мають задовольняти таке *характеристичне рівняння*:

$$\sum_{\alpha+\beta+\gamma=N} C_{\alpha,\beta,\gamma} e_2^\beta e_3^\gamma = 0. \quad (1.3)$$

Якщо ліву частину рівняння (1.3) розкласти за базисом алгебри, то характеристичне рівняння (1.3) рівносильне *характеристичній системі рівнянь*, породженій рівнянням (1.3).

Таким чином, при виконанні умови (1.3) кожна аналітична функція  $\Phi$  зі значеннями в довільній комутативній асоціативній алгебрі задовольняє рівняння (1.1), і, відповідно, усі дійснозначні компоненти функції  $\Phi$  є розв'язками рівняння (1.1).

В роботі [6] розглядаються диференціальні рівняння в частинних похідних від декількох змінних і наведено ряд прикладів на застосування описаного вище методу.

І. Мельниченко [4] запропонував розглядати в рівності (1.2) функції  $\Phi$ , що  $N$  разів диференційовні за Гато. При цьому неперервну і диференційовну за Гато функцію І. Мельниченко назвав *моногенною*.

Підкреслимо, що описаний вище підхід до побудови розв'язків певних класів рівнянь з частинними похідними розвивається з використанням комутативних алгебр. І тому результати, що одержуються у цьому напрямку ніяк не можуть бути наслідками деяких схожих за формою результатів з кліффордового аналізу. Зокрема, в роботі [9] отримано конструктивний опис моногенних функцій (пов'язаних з рівнянням (1.1)) зі значеннями в довільній комутативній асоціативній алгебрі над полем  $\mathbb{C}$  за допомогою голоморфних функцій комплексної змінної.

В роботі [11] показано, що для побудови розв'язків рівняння (1.1) у вигляді компонент моногенних функцій зі значеннями в скінченновимірних комутативних асоціативних алгебрах достатньо обмежитись вивченням моногенних функцій у алгебрах певного виду. Зупинимось детальніше на цьому результаті.

Нехай  $\mathbb{N}$  — множина натуральних чисел і  $m, n \in \mathbb{N}$  такі, що  $m \leq n$ . Нехай далі  $\mathbb{A}_n^m$  — довільна комутативна асоціативна алгебра з одиницею над полем комплексних чисел  $\mathbb{C}$ . Е. Картан [1, с. 33] довів, що в алгебрі  $\mathbb{A}_n^m$  існує базис  $\{I_k\}_{k=1}^n$ , який задовольняє наступні правила множення:

- для всіх  $r, s \in [1, m] \cap \mathbb{N}$

$$I_r I_s = \begin{cases} 0 & \text{при } r \neq s, \\ I_r & \text{при } r = s; \end{cases}$$

- для всіх  $r, s \in [m+1, n] \cap \mathbb{N}$

$$I_r I_s = \sum_{k=\max\{r,s\}+1}^n \Upsilon_{r,k}^s I_k \quad (1.4)$$

- для кожного  $s \in [m+1, n] \cap \mathbb{N}$  існує таке  $u_s \in [1, m] \cap \mathbb{N}$ , що для всіх  $r \in [1, m] \cap \mathbb{N}$

$$I_r I_s = \begin{cases} 0 & \text{при } r \neq u_s, \\ I_s & \text{при } r = u_s. \end{cases}$$

Відмітимо, що перші  $m$  базисних векторів  $\{I_u\}_{u=1}^m$  є ідемпотентами і породжують напівпросту підалгебру  $S$  алгебри  $\mathbb{A}_n^m$ . Очевидно також, що вектори  $\{I_r\}_{r=m+1}^n$  породжують нільпотентну підалгебру  $N$  цієї алгебри. Крім того, з правил множення алгебри  $\mathbb{A}_n^m$  випливає, що  $\mathbb{A}_n^m$  є напівпрямою сумою  $m$ -вимірної напівпростой підалгебри  $S$  і  $(n-m)$ -вимірної нільпотентної підалгебри  $N$ , тобто

$$\mathbb{A}_n^m = S \oplus_s N.$$

Теорема 5.1 роботи [11] стверджує, що для побудови розв'язків диференціального рівняння (1.1) у вигляді компонент моногенних функцій зі значеннями в комутативних асоціативних алгебрах, достатньо обмежитись вивченням моногенних функцій в алгебрах з базисом

$$\{1, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n\},$$

де  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$  — нільпотенти, тобто в алгебрах виду

$$\mathbb{A}_n := \mathbb{A}_n^1 = 1 \oplus_s N.$$

Це означає, що кількість таких  $n$ -вимірних комутативних асоціативних алгебр з одиницею над полем  $\mathbb{C}$ , в яких потрібно вивчати моногенні функції, дорівнює кількості  $(n-1)$ -вимірних комутативних асоціативних нільпотентних алгебр над  $\mathbb{C}$ . Наведемо таблицю з даними про кількість таких алгебр (відносно посилань по кількості таких алгебр див. зауваження 5.3 в роботі [11]).

$n$	кількість алгебр виду $\mathbb{A}_n^m$	кількість алгебр виду $\mathbb{A}_n$
2	2	1
3	4	2
4	9	4
5	25	9
6	53	25
$\geq 7$	$\infty$	$\infty$

У даній роботі буде встановлено зв'язок між моногенними функціями, що визначені в алгебрах  $\mathbb{A}_n$  та в спеціальних алгебрах виду  $\mathbb{A}_{n+1}$  (які буде названо *розширеннями*) при всіх натуральних  $n \geq 2$ . Для рівняння (1.1) це означатиме таке: якщо комплекснозначний розв'язок  $U(x, y, z)$  рівняння (1.1) є деякою компонентою моногенної функції в

деякій алгебрі  $\mathbb{A}_n$  при  $n < N$ , то серед алгебр виду  $\mathbb{A}_N$  існує алгебра  $\mathbb{A}$  і існує моногенна функція  $\Phi$  в  $\mathbb{A}$  така, що  $U(x, y, z) \in$  деякою компонентою функції  $\Phi$ .

## 2. ХАРАКТЕРИСТИЧНЕ РІВНЯННЯ В АЛГЕБРАХ $\mathbb{A}_n$

Спершу покажемо, що у всіх алгебрах виду  $\mathbb{A}_n$  характеристичне рівняння (1.3) завжди має розв'язки.

З правил множення алгебри  $\mathbb{A}_n^m$  випливає, що таблиця множення алгебри  $\mathbb{A}_n$  має вигляд

$$I_r I_s = \sum_{k=\max\{r,s\}+1}^n \Upsilon_{r,k}^s I_k, \quad \forall r, s \in \{1, 2, \dots, n-1\}, \quad (2.1)$$

тобто

·	1	$I_1$	$I_2$	...	$I_{n-1}$	), (2.2)
1	1	$I_1$	$I_2$	...	$I_{n-1}$	
$I_1$	$I_1$	$\sum_{k=2}^{n-1} \Upsilon_{1,k}^1 I_k$	$\sum_{k=3}^{n-1} \Upsilon_{2,k}^1 I_k$	...	0	
$I_2$	$I_2$	$\sum_{k=3}^{n-1} \Upsilon_{2,k}^1 I_k$	$\sum_{k=3}^{n-1} \Upsilon_{2,k}^2 I_k$	...	0	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	
$I_{n-1}$	$I_{n-1}$	0	0	...	0	

де структурні константи алгебри  $\Upsilon_{r,k}^s \in \mathbb{C}$  такі як і в рівності (1.4). Покладемо  $I_0 := 1$ .

**Лема 2.1.** Для довільного елемента  $a := \sum_{k=0}^{n-1} a_k I_k$ ,  $a_k \in \mathbb{C}$ , алгебри  $\mathbb{A}_n$  і довільного натурального  $\beta$  справедлива рівність

$$a^\beta = a_0^\beta + \sum_{k=1}^{n-1} P_k(a_0, a_1, \dots, a_k) I_k, \quad (2.3)$$

де  $P_k$  — однорідний поліном степеня  $\beta$  своїх аргументів.

**Доведення.** Скористаємось методом математичної індукції по  $\beta$ . При  $\beta = 1$  твердження леми очевидне. Припустимо, що формула (2.3) справедлива при  $\beta = s$ :

$$a^s = a_0^s + \sum_{k=1}^{n-1} P_k(a_0, a_1, \dots, a_k) I_k$$

де  $P_k$  — однорідний поліном степеня  $s$ . Користуючись таблицею множення алгебри  $\mathbb{A}_n$ , доведемо справедливність формули (2.3) при  $\beta = s + 1$ . Отже, маємо:

$$\begin{aligned} a^{s+1} &= a^s a = a_0^{s+1} + I_1(a_0^s a_1 + P_1 a_0) + I_2(a_0^s a_2 + P_1 a_1 \Upsilon_{1,1}^2 + a_0 P_2) + \dots \\ &\dots + I_{n-1} \left[ a_0^s a_{n-1} + P_{n-1} a_0 + \Upsilon_{1,n-1}^1 a_1 P_1 + \Upsilon_{2,n-1}^1 (a_2 P_1 + a_1 P_2) + \right. \\ &\quad + \Upsilon_{2,n-1}^2 a_2 P_2 + \Upsilon_{3,n-1}^1 (a_3 P_1 + a_1 P_3) + \Upsilon_{3,n-1}^1 (a_3 P_1 + a_1 P_3) + \\ &\quad \left. + \Upsilon_{3,n-1}^2 (a_3 P_2 + a_2 P_3) \dots + \Upsilon_{n-1,n-1}^{n-2} a_{n-2} P_{n-2} \right] =: \\ &=: a_0^{s+1} + \sum_{k=1}^{n-1} \tilde{P}_k(a_0, a_1, \dots, a_k) I_k, \end{aligned}$$

де  $\tilde{P}_k$  — однорідний поліном степеня  $s + 1$ .  $\square$

Повністю аналогічно до леми 2.1, з використанням таблиці множення (2.2), доводиться така лема.

**Лема 2.2.** *Поліноми  $P_k$  з рівності (2.3) подаються у вигляді*

$$P_k(a_0, a_1, \dots, a_k) = \beta a_0^{\beta-1} a_k + \hat{P}_k(a_0, a_1, \dots, a_{k-1}),$$

де  $\hat{P}_k$  — однорідний поліном степеня  $\beta$ .  $\square$

**Теорема 2.3.** *В кожній алгебрі виду  $\mathbb{A}_n$  характеристичне рівняння (1.3) має розв'язки.*

**Доведення.** Нехай

$$e_1 = 1, \quad e_2 = \sum_{r=0}^{n-1} a_r I_r, \quad e_3 = \sum_{r=0}^{n-1} b_r I_r,$$

де  $a_r, b_r \in \mathbb{C}$ .

З леми 2.1 випливають рівності

$$e_2^\beta = a_0^\beta + \sum_{k=1}^{n-1} P_k(a_0, a_1, \dots, a_k) I_k, \quad e_3^\gamma = b_0^\gamma + \sum_{k=1}^{n-1} Q_k(b_0, b_1, \dots, b_k) I_k,$$

де  $P_k, Q_k$  — однорідні поліноми степенів  $\beta$  і  $\gamma$ , відповідно. Тоді для лівої частини рівняння (1.3) маємо

$$\begin{aligned} \sum_{\alpha+\beta+\gamma=N} C_{\alpha,\beta,\gamma} e_2^\beta e_3^\gamma &= \sum_{\alpha+\beta+\gamma=N} C_{\alpha,\beta,\gamma} a_0^\beta b_0^\gamma + I_1 R_1(b_0^\gamma P_1, a_0^\beta Q_1) + \\ &+ I_2 R_2(b_0^\gamma P_2, a_0^\beta Q_2, P_1 Q_1) + I_3 R_3(b_0^\gamma P_3, a_0^\beta Q_3, P_1 Q_1, P_1 Q_2, P_2 Q_1) + \dots \\ &\dots + I_{n-1} R_{n-1}(b_0^\gamma P_{n-1}, a_0^\beta Q_{n-1}, P_i Q_j, i, j = \{1, 2, \dots, n-2\}), \end{aligned}$$

де  $R_k$  — лінійна функція своїх аргументів. Отже, при  $k = 1, 2, \dots, n - 1$  функція  $R_k$  є однорідним поліномом степеня  $\beta + \gamma$  від аргументів  $a_0, b_0, a_1, b_1, \dots, a_k, b_k$ .

Таким чином, характеристичне рівняння (1.3) рівносильне такій характеристичній системі рівнянь:

$$\begin{aligned} \sum_{\alpha+\beta+\gamma=N} C_{\alpha,\beta,\gamma} a_0^\beta b_0^\gamma &= 0, \\ R_1(a_0, b_0, a_1, b_1) &= 0, \\ &\dots\dots\dots \\ R_{n-1}(a_0, b_0, a_1, b_1, \dots, a_{n-1}, b_{n-1}) &= 0, \end{aligned} \tag{2.4}$$

де поліноми  $R_k$  визначені вище.

Перше рівняння системи (2.4) є комплексним поліномом від двох змінних степеня  $\beta + \gamma$ . Зафіксуємо  $a_0 \neq 0$ . Тоді за основною теоремою алгебри з першого рівняння системи (2.4) знаходимо  $b_0$ . Тепер  $a_0, b_0$  визначені. Тоді за лемою 2.2 друге рівняння системи (2.4) є лінійним відносно невідомих  $a_1, b_1$ . Зафіксуємо  $a_1$ . Тоді з лінійного відносно  $b_1$  рівняння  $R_1(a_0, b_0, a_1, b_1) = 0$  знаходимо  $b_1$  через  $a_0, a_1$ . Аналогічно з третього рівняння виражаємо  $b_2$  через  $a_0, a_1, a_2$ . Продовжуючи цей процес  $n - 1$  раз всі  $b_k$  при  $k = 1, 2, \dots, n - 1$  будуть виражені через  $a_0, a_1, \dots, a_k$ . При цьому  $a_0, a_1, \dots, a_k$  — довільні комплексні числа.  $\square$

Зауважимо, що в теоремі 2.3 не стверджується лінійна незалежність векторів  $e_1, e_2, e_3$ .

Отже, ми довели навіть більше, що за умов теореми 2.3 вектор  $e_2$  (або  $e_3$ ) можна вибрати довільним, а тому знайдеться вектор  $e_3$  (або  $e_2$ ), який задовольняє характеристичне рівняння (1.3).

Теорему 2.3 можна узагальнити на випадок характеристичного рівняння вигляду:

$$\sum_{\alpha,\beta,\gamma} C_{\alpha,\beta,\gamma} e_1^\alpha e_2^\beta e_3^\gamma = 0, \tag{2.5}$$

тобто сума  $\alpha + \beta + \gamma$  не рівна  $N$ . Ми також відмовилися від умови  $e_1 = 1$ .

**Наслідок 2.4.** *В кожній алгебрі виду  $\mathbb{A}_n$  характеристичне рівняння (2.5) має розв'язки.*

Доведення повністю аналогічне до доведення теореми 2.3, лише у системі (2.4)  $R_k$  є поліномами степеня  $\alpha + \beta + \gamma$ , але не однорідними.

Характеристичне рівняння (2.5) виникає тоді, коли ми розглядаємо лінійне диференціальне рівняння вигляду

$$\sum_{\alpha, \beta, \gamma} C_{\alpha, \beta, \gamma} \frac{\partial^N U}{\partial x^\alpha \partial y^\beta \partial z^\gamma} = 0, \quad C_{\alpha, \beta, \gamma} \in \mathbb{R}. \quad (2.6)$$

У цьому випадку функція  $\Phi(\zeta) = \exp \zeta$  при  $\zeta = xe_1 + ye_2 + ze_3$  зі значеннями у будь-якій алгебрі виду  $\mathbb{A}_n$  є розв'язком рівняння (2.6), якщо вектори  $e_1, e_2, e_3$  задовольняють рівняння (2.5). Вказаний підхід було реалізовано в роботі [10] для рівняння

$$V_{ttt}(t, x) + \mu V_{tt}(t, x) - \nu V_{xx}(t, x) = 0,$$

при  $\mu, \nu \in (0, \infty)$ , яке використовується в одній моделі гідродинаміки.

### 3. РОЗШИРЕННЯ АЛГЕБРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Нехай  $\tilde{\mathbb{A}}_{n+1}$  —  $(n+1)$ -вимірна комутативна асоціативна алгебра з базисом  $\{1, \tilde{I}_1, \tilde{I}_2, \dots, \tilde{I}_n\}$  виду (2.1):

$$\forall r, s \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \tilde{I}_r \tilde{I}_s = \sum_{k=\max\{r, s\}+1}^n \tilde{\Upsilon}_{r, k}^s \tilde{I}_k.$$

Нехай, як і раніше,  $\mathbb{A}_n$  —  $n$ -вимірна комутативна асоціативна алгебра з базисом  $\{1, I_1, I_2, \dots, I_{n-1}\}$  і таблицею множення (2.1).

**Означення 3.1.** Алгебра  $\tilde{\mathbb{A}}_{n+1}$  називається розширенням алгебри  $\mathbb{A}_n$ , якщо справедливі рівності

$$\tilde{\Upsilon}_{r, k}^s = \Upsilon_{r, k}^s \quad (3.1)$$

$$\forall k \in \{2, \dots, n-1\} \quad \forall r, s \in \{1, 2, \dots, k-1\}. \quad (3.2)$$

Надалі розширення алгебри  $\mathbb{A}_n$  позначатимемо через  $\mathbb{E}(\mathbb{A}_n)$ .

**Зауваження 3.2.** З умови (3.2) випливає, що  $r, s = 1, 2, \dots, n-2$ . Тому для коректності означення необхідно, щоб  $n \geq 3$ . При  $n = 2$  за означенням покладаємо, що алгебра  $\mathbb{A}_3(\alpha)$ ,  $\alpha \in \mathbb{C}$ , з таблицею множення

·	1	$\tilde{I}_1$	$\tilde{I}_2$
1	1	$\tilde{I}_1$	$\tilde{I}_2$
$\tilde{I}_1$	$\tilde{I}_1$	$\alpha \tilde{I}_2$	0
$\tilde{I}_2$	$\tilde{I}_2$	0	0

є розширенням бігармонічної алгебри  $\mathbb{B}$  (див., наприклад, [2]) з таблицею множення



·	1	$I_1$
1	1	$I_1$
$I_1$	$I_1$	0

Зауважимо, що алгебра  $\mathbb{A}_3(\alpha)$  при всіх  $\alpha \in \mathbb{C}$  ізоморфна алгебрі  $\mathbb{A}_3(1)$ , моногенні функції в якій вивчались в роботі [5].

**Зауваження 3.3.** Іншими словами, рівність (3.1) означає, що якщо в таблиці множення виду (2.2) алгебри  $\mathbb{E}(\mathbb{A}_n)$  відкинути останній рядок і останній стовпчик і скрізь у таблиці множення елемент  $\tilde{I}_n$  замінити на нуль, то отримаємо таблицю множення алгебри  $\mathbb{A}_n$ .

Розглянемо приклади розширень.

**Приклад 3.4.** Кожна з наведених нижче алгебр є розширенням попередньої алгебри.

$$\mathbb{B} \rightarrow \mathbb{A}_3(1) \rightarrow \begin{array}{c|ccc|c} \cdot & 1 & I_1 & I_2 & I_3 \\ \hline 1 & 1 & I_1 & I_2 & I_3 \\ I_1 & I_1 & I_2 & I_3 & 0 \\ \hline I_2 & I_2 & I_3 & 0 & 0 \\ I_3 & I_3 & 0 & 0 & 0 \end{array} \rightarrow \begin{array}{c|cccc|c} \cdot & 1 & I_1 & I_2 & I_3 & I_4 \\ \hline 1 & 1 & I_1 & I_2 & I_3 & I_4 \\ I_1 & I_1 & I_2 & I_3 & I_4 & 0 \\ I_2 & I_2 & I_3 & I_4 & 0 & 0 \\ I_3 & I_3 & I_4 & 0 & 0 & 0 \\ I_4 & I_4 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}.$$

Можна говорити також про *послідовність розширень*. Очевидно, що наведені вище алгебри мають такі відповідні базиси:  $\{1, I^1\}$ ,  $I^2 = 0$ ;  $\{1, I^1, I^2\}$ ,  $I^3 = 0$ ;  $\{1, I^1, I^2, I^3\}$ ,  $I^4 = 0$ ;  $\{1, I^1, I^2, I^3, I^4\}$ ,  $I^5 = 0$ . Для кожного натурального  $n$  розглянемо алгебру з базисом  $\{1, I^1, I^2, \dots, I^n\}$ ,  $I^{n+1} = 0$ . Очевидно, що  $(n + 1)$ -ша алгебра є розширенням  $n$ -ї алгебри. Якщо  $n$  пробігає всю множину натуральних чисел, то у такому випадку будемо казати, що маємо *послідовність розширень*.

Наведемо найпростіші властивості розширень.

- 1° Розширення алгебри  $\mathbb{A}_n$  не єдине.
- 2° Довільна алгебра виду  $\mathbb{A}_{n+1}$  є розширенням лише однієї алгебри.

Перейдемо до вивчення аналітичних властивостей в алгебрі  $\mathbb{A}_n$  та в її розширенні  $\mathbb{E}(\mathbb{A}_n)$ .

**Означення 3.5.** На алгебрі  $\mathbb{E}(\mathbb{A}_n)$  визначимо лінійний оператор

$$\tilde{P} : \mathbb{E}(\mathbb{A}_n) \mapsto \mathbb{A}_n$$

рівностями

$$\tilde{P}(1) = 1, \quad \tilde{P}(\tilde{I}_k) = I_k \quad \forall k = 1, 2, \dots, n - 1, \quad \tilde{P}(\tilde{I}_n) = 0.$$

Тобто, для довільного  $\tilde{a} := a_0 + \sum_{k=1}^n a_k \tilde{I}_k \in \mathbb{E}(\mathbb{A}_n)$ ,  $a_0, a_k \in \mathbb{C}$  маємо

$$\tilde{P}(\tilde{a}) = a_0 + \sum_{k=1}^{n-1} a_k I_k \in \mathbb{A}_n.$$

**Означення 3.6.** На алгебрі  $\mathbb{A}_n$  визначимо лінійний оператор

$$P : \mathbb{A}_n \mapsto \mathbb{E}(\mathbb{A}_n)$$

рівностями

$$P(1) = 1, \quad P(I_k) = \tilde{I}_k \quad \forall k = 1, 2, \dots, n-1.$$

Тобто, для довільного  $a := a_0 + \sum_{k=1}^{n-1} a_k I_k \in \mathbb{A}_n$ ,  $a_0, a_k \in \mathbb{C}$  маємо

$$P(a) = a_0 + \sum_{k=1}^{n-1} a_k \tilde{I}_k \in \mathbb{E}(\mathbb{A}_n).$$

**Зауваження 3.7.** Надалі у цій роботі для елемента  $\tilde{a} \in \mathbb{E}(\mathbb{A}_n)$  і елемента  $a \in \mathbb{A}_n$  використовуватимуться позначення, введені в означеннях 3.5 та 3.6.

**Твердження 3.8.** Оператор  $\tilde{P}$  узагальнено обернений відносно  $P$ .

Доведення проводиться шляхом безпосередньої перевірки рівності  $P\tilde{P}P = P$ .

**Теорема 3.9.** Для довільних  $\tilde{a}, \tilde{b} \in \mathbb{E}(\mathbb{A}_n)$  справедлива рівність

$$\tilde{P}(\tilde{a}\tilde{b}) = \tilde{P}(\tilde{a})\tilde{P}(\tilde{b}). \quad (3.3)$$

**Доведення.** Розглянемо рівність

$$\begin{aligned} \tilde{P}(\tilde{I}_s \tilde{I}_r) &= \tilde{P} \left( \sum_{k=\max\{r,s\}+1}^n \Upsilon_{r,k}^s \tilde{I}_k \right) = \sum_{k=\max\{r,s\}+1}^n \Upsilon_{r,k}^s \tilde{P}(\tilde{I}_k) \\ &= \sum_{k=\max\{r,s\}+1}^{n-1} \Upsilon_{r,k}^s I_k = I_s I_r. \end{aligned} \quad (3.4)$$

Тепер з урахуванням рівності (3.4), маємо

$$\begin{aligned} \tilde{P}(\tilde{a}\tilde{b}) &= \tilde{P} \left( \sum_{i,j=0}^n a_i b_j \tilde{I}_i \tilde{I}_j \right) = \sum_{i,j=0}^n a_i b_j \tilde{P}(\tilde{I}_i \tilde{I}_j) \\ &= \sum_{i,j=0}^{n-1} a_i b_j I_i I_j = ab = \tilde{P}(\tilde{a})\tilde{P}(\tilde{b}). \end{aligned} \quad \square$$

**Наслідок 3.10.** Для довільного  $\tilde{a} \in \mathbb{E}(\mathbb{A}_n)$  такого, що  $a_0 \neq 0$  справедлива рівність

$$\tilde{P}(\tilde{a}^{-1}) = a^{-1}. \quad (3.5)$$

**Доведення.** Поклавши  $\tilde{b} = \tilde{a}^{-1}$  в рівності (3.3) отримаємо

$$\tilde{P}(\tilde{a} \tilde{a}^{-1}) = \tilde{P}(1) = 1 = \tilde{P}(\tilde{a}) \tilde{P}(\tilde{a}^{-1}) = a \tilde{P}(\tilde{a}^{-1}). \quad \square$$

Продемонструємо рівність (3.5) на простому прикладі. Як зазначалося в зауваженні 3.2, алгебра  $\mathbb{A}_3(\alpha)$  є розширенням алгебри  $\mathbb{B}$ .

**Приклад 3.11.** В алгебрі  $\mathbb{B}$  обернений елемент  $a^{-1}$  має вигляд

$$a^{-1} = \frac{1}{a_0} - \frac{a_1}{a_0^2} I_1, \quad a_0 \neq 0.$$

А в алгебрі  $\mathbb{A}_3(\alpha)$  обернений елемент  $\tilde{a}^{-1}$  має такий вигляд

$$\tilde{a}^{-1} = \frac{1}{a_0} - \frac{a_1}{a_0^2} \tilde{I}_1 + \left( \frac{a_2}{a_0^2} + \frac{a_1^2}{a_0^3} \alpha \right) \tilde{I}_2, \quad a_0 \neq 0.$$

На цих прикладах бачимо виконання рівності (3.5).

**Означення 3.12.** Для довільного  $k \in \mathbb{N}$  та довільного  $\tilde{a} \in \mathbb{E}(\mathbb{A}_n)$  визначимо  $\tilde{a}^{-k}$  такою рівністю  $\tilde{a}^{-k} := (\tilde{a}^{-1})^k$ .

З (3.3) випливає ще такий наслідок.

**Наслідок 3.13.** Для довільного цілого  $k$  і довільного  $\tilde{a} \in \mathbb{E}(\mathbb{A}_n)$  справедлива рівність

$$\tilde{P}(\tilde{a}^k) = (\tilde{P}(\tilde{a}))^k. \quad (3.6)$$

Наступний наслідок випливає з рівностей (3.3) та (3.6).

**Наслідок 3.14.** Якщо вектори  $\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \tilde{e}_3$  алгебри  $\mathbb{E}(\mathbb{A}_n)$  задовольняють рівняння (2.5), то вектори  $\tilde{P}(\tilde{e}_1), \tilde{P}(\tilde{e}_2), \tilde{P}(\tilde{e}_3)$  алгебри  $\mathbb{A}_n$  також задовольняють рівняння (2.5).

**Приклад 3.15.** Якщо вектори

$$e_1 = 1, \quad e_2 = a_0 + a_1 I_1 + a_2 I_2, \quad e_3 = b_0 + b_1 I_1 + b_2 I_2,$$

$a_k, b_k \in \mathbb{C}$ , алгебри  $\mathbb{A}_3(\alpha)$  задовольняють рівняння (2.5), то вектори

$$e_1 = 1, \quad e_2 = a_0 + a_1 I_1, \quad e_3 = b_0 + b_1 I_1$$

вже алгебри  $\mathbb{B}$  також задовольняють рівняння (2.5).

Далі доведемо теорему, яка встановлює зв'язок між алгебрами виду  $\mathbb{A}_n$  та їх розширеннями. З цією метою введемо таке означення.

**Означення 3.16.** Нульовим розширенням алгебри виду  $\mathbb{A}_n$  назовемо таке розширення  $\mathbb{E}_0(\mathbb{A}_n)$  в якому

$$\tilde{\Upsilon}_{r,n+1}^s = 0 \quad \forall r, s = 1, 2, \dots, n.$$

Іншими словами, таблиця множення нульового розширення  $\mathbb{E}_0(\mathbb{A}_n)$  утворюється з таблиці множення алгебри  $\mathbb{A}_n$  шляхом додавання  $(n+1)$ -го рядка і  $(n+1)$ -го стовпчика скрізь заповнених нулями крім тих клітинок де відбувається множення на одиницю алгебри.

Очевидно, що *нульове розширення єдине*. Наприклад, серед усіх розширень  $\mathbb{A}_3(\alpha)$ ,  $\alpha \in \mathbb{C}$ , алгебри  $\mathbb{B}$  нульовим розширенням є лише алгебра  $\mathbb{A}_3(0)$ .

Якщо оператор  $P$ , який визначений в означенні 3.6, приймає значення в нульовому розширенні  $\mathbb{E}_0(\mathbb{A}_n)$ , то подібно до оператора  $\tilde{P}$ , він буде мультиплікативним. А саме, аналогічно до доведення теореми 3.9 доводиться наступне твердження.

**Теорема 3.17.** *Для довільної алгебри виду  $\mathbb{A}_n$  та оператора*

$$P : \mathbb{A}_n \mapsto \mathbb{E}_0(\mathbb{A}_n)$$

*справедлива рівність*

$$P(ab) = P(a)P(b) \quad \forall a, b \in \mathbb{A}_n. \quad (3.7)$$

**Теорема 3.18.** *Якщо нульові розширення  $\mathbb{E}_0(\mathbb{V}_n)$  та  $\mathbb{E}_0(\mathbb{W}_n)$  алгебр виду (2.2) неізоморфні, то й алгебри  $\mathbb{V}_n$  і  $\mathbb{W}_n$  також неізоморфні.*

**Доведення.** Будемо доводити методом від супротивного. Припустимо, що алгебри  $\mathbb{V}_n$  та  $\mathbb{W}_n$  ізоморфні. Це означає, що існує таке лінійне взаємно однозначне відображення  $\varphi : \mathbb{V}_n \rightarrow \mathbb{W}_n$ , що для довільних  $a, b \in \mathbb{V}_n$  справедлива рівність

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Нехай  $\{I_k\}_{k=0}^{n-1}$  — базис алгебри  $\mathbb{V}_n$ ,  $\{\tilde{I}_k\}_{k=0}^n$  — базис алгебри  $\mathbb{E}_0(\mathbb{V}_n)$ , а  $\{\tilde{\rho}_k\}_{k=0}^n$  — базис алгебри  $\mathbb{E}_0(\mathbb{W}_n)$ . Визначимо відображення

$$\psi : \mathbb{E}_0(\mathbb{V}_n) \rightarrow \mathbb{E}_0(\mathbb{W}_n)$$

рівностями:

$$\psi(\tilde{I}_k) = P(\varphi(I_k)), \quad (k = 0, 1, \dots, n-1), \quad \psi(\tilde{I}_n) = \tilde{\rho}_n. \quad (3.8)$$

Оскільки відображення  $\varphi : \mathbb{V}_n \rightarrow \mathbb{W}_n$  та оператор  $P : \mathbb{W}_n \rightarrow \mathbb{E}_0(\mathbb{W}_n)$  — лінійні, то за визначенням (3.8) відображення  $\psi : \mathbb{E}_0(\mathbb{V}_n) \rightarrow \mathbb{E}_0(\mathbb{W}_n)$  також лінійне. Це дає змогу за допомогою рівностей (3.8) визначити

відображення  $\psi$  для всіх  $\tilde{a} \in \mathbb{E}_0(\mathbb{V}_n)$ :

$$\psi(\tilde{a}) = P(\varphi(a)) + a_n \tilde{\rho}_n. \quad (3.9)$$

Тепер для відображення  $\psi : \mathbb{E}_0(\mathbb{V}_n) \rightarrow \mathbb{E}_0(\mathbb{W}_n)$  доведемо співвідношення

$$\psi(\tilde{a}\tilde{b}) = \psi(\tilde{a})\psi(\tilde{b}), \quad \forall \tilde{a}, \tilde{b} \in \mathbb{E}_0(\mathbb{V}_n). \quad (3.10)$$

Беручи до уваги рівність (3.9), маємо співвідношення

$$\psi(\tilde{a}\tilde{b}) = P(\varphi(ab)) + (a_n b_0 + b_n a_0) \tilde{\rho}_n. \quad (3.11)$$

Розглянемо добуток

$$\begin{aligned} \psi(\tilde{a})\psi(\tilde{b}) &= (P(\varphi(a)) + a_n \tilde{\rho}_n) (P(\varphi(b)) + b_n \tilde{\rho}_n) = \\ &= P(\varphi(a))P(\varphi(b)) + (P(\varphi(a)) b_n + P(\varphi(b)) a_n) \tilde{\rho}_n. \end{aligned} \quad (3.12)$$

Оскільки оператор  $P$  приймає значення в нульовому розширенні  $\mathbb{E}_0(\mathbb{W}_n)$ , то очевидними є рівності

$$P(\varphi(a)) b_n \tilde{\rho}_n = a_0 b_n \tilde{\rho}_n, \quad P(\varphi(b)) a_n \tilde{\rho}_n = b_0 a_n \tilde{\rho}_n. \quad (3.13)$$

Враховуючи співвідношення (3.7), (3.13), рівність (3.12) набуває вигляду

$$\psi(\tilde{a})\psi(\tilde{b}) = P(\varphi(ab)) + (a_n b_0 + b_n a_0) \tilde{\rho}_n. \quad (3.14)$$

Нарешті, наслідком рівностей (3.11), (3.14) є рівність (3.10).

Тепер покажемо, що відображення  $\psi$  взаємно однозначне. За визначенням (3.8), матриця переходу від базису до базису має вигляд

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \alpha_{1,0} & \alpha_{1,1} & \dots & \alpha_{1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n-1,0} & \alpha_{n-1,1} & \dots & \alpha_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Оскільки за припущенням алгебри  $\mathbb{V}$  та  $\mathbb{W}$  ізоморфні, то  $\det A \neq 0$ , де

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \alpha_{1,0} & \alpha_{1,1} & \dots & \alpha_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n-1,0} & \alpha_{n-1,1} & \dots & \alpha_{n-1,n-1} \end{pmatrix}.$$

Розкладаючи  $\det \tilde{A}$  за елементами останнього рядка, отримаємо

$$\det \tilde{A} = 1 \cdot \det A \neq 0,$$

а отже відображення  $\psi$  є взаємно однозначним.

Таким чином, ми побудували лінійне взаємно однозначне відображення  $\psi : \mathbb{E}_0(\mathbb{V}_n) \rightarrow \mathbb{E}_0(\mathbb{W}_n)$ , яке задовольняє умову (3.10). Це означає,

що алгебри  $\mathbb{E}_0(\mathbb{V}_n)$  та  $\mathbb{E}_0(\mathbb{W}_n)$  ізоморфні. Ми прийшли до суперечності з умовою теореми. Отже, алгебри  $\mathbb{V}$  та  $\mathbb{W}$  не є ізоморфними.  $\square$

**Зауваження 3.19.** З таблиць множення алгебр виду  $\mathbb{A}_n$  для значень  $n = 2, 3, 4, 5, 6$  (про таблиці множення див. зауваження 5.3 в роботі [11]) видно, що нульові розширення неізоморфних  $(n - 1)$ -вимірних алгебр виду  $\mathbb{A}_{n-1}$  знову є неізоморфними. Теорема 3.18 є, в певному сенсі, оберненим результатом до вказаного факту, але для всіх натуральних  $n \geq 2$ .

#### 4. МОНОГЕННІ ФУНКЦІЇ НА РОЗШИРЕННЯХ АЛГЕБРИ $\mathbb{A}_n$

Нехай

$$e_1 = 1, \quad e_2 = \sum_{r=0}^{n-1} a_r I_r, \quad e_3 = \sum_{r=0}^{n-1} b_r I_r \quad (4.1)$$

при  $a_r, b_r \in \mathbb{C}$  — трійка векторів в алгебрі  $\mathbb{A}_n$ .

Нехай також  $\zeta = xe_1 + ye_2 + ze_3$ , де  $x, y, z \in \mathbb{R}$ . Комплексне число  $\xi = x + ya_0 + zb_0$  називається *спектром* точки  $\zeta$ . Виділимо в алгебрі  $\mathbb{A}_n$  лінійну оболонку  $E_3 := \{\zeta = xe_1 + ye_2 + ze_3 : x, y, z \in \mathbb{R}\}$  породжену векторами  $e_1, e_2, e_3$ .

Далі істотним є припущення:  $ya_0 + zb_0 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$  при всіх дійсних  $y, z$ . Очевидно, що це має місце тоді і тільки тоді, коли хоча б одне з чисел  $a_0$  чи  $b_0$  належить  $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ . В теоремі 7.1 роботи [9] встановлено підклас рівнянь вигляду (1.1) для яких умова  $ya_0 + zb_0 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$  виконується при всіх дійсних  $y, z$ .

Області  $\Omega$  простору  $\mathbb{R}^3$  поставимо у відповідність область

$$\Omega_\zeta := \{\zeta = xe_1 + ye_2 + ze_3 : (x, y, z) \in \Omega\}$$

в  $E_3$ .

Неперервну функцію  $\Phi : \Omega_\zeta \rightarrow \mathbb{A}_n$  називатимемо *моногенною* в області  $\Omega_\zeta \subset E_3$ , якщо  $\Phi$  диференційовна за Гато в кожній точці цієї області, тобто якщо для кожного  $\zeta \in \Omega_\zeta$  існує елемент  $\Phi'(\zeta)$  алгебри  $\mathbb{A}_n$  такий, що виконується рівність

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+0} (\Phi(\zeta + \varepsilon h) - \Phi(\zeta)) \varepsilon^{-1} = h\Phi'(\zeta) \quad \forall h \in E_3.$$

При цьому  $\Phi'(\zeta)$  називається *похідною Гато* функції  $\Phi$  в точці  $\zeta$ .

Розглянемо розклад функції  $\Phi : \Omega_\zeta \rightarrow \mathbb{A}_n$  за базисом  $\{I_k\}_{k=0}^{n-1}$ :

$$\Phi(\zeta) = \sum_{k=0}^{n-1} U_k(x, y, z) I_k.$$

У випадку, коли функції  $U_k : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  є  $\mathbb{R}$ -диференційовними в області  $\Omega$ , тобто для довільного  $(x, y, z) \in \Omega$

$$\begin{aligned} & U_k(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - U_k(x, y, z) = \\ & = \frac{\partial U_k}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial U_k}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial U_k}{\partial z} \Delta z + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}\right), \end{aligned}$$

при  $(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 \rightarrow 0$ , функція  $\Phi$  є моногенною в області  $\Omega_\zeta$  тоді і тільки тоді, коли у кожній точці з  $\Omega_\zeta$  виконуються умови:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} = \frac{\partial \Phi}{\partial x} e_2, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial z} = \frac{\partial \Phi}{\partial x} e_3.$$

Відмітимо, що розклад резольвенти має вигляд

$$(te_1 - \zeta)^{-1} = \frac{1}{t - \xi} + \sum_{s=1}^{n-1} \sum_{k=2}^{s+1} \frac{Q_{k,s}}{(t - \xi)^k} I_s \quad (4.2)$$

для всіх  $t \in \mathbb{C}$  таких, що  $t \neq \xi$ , де  $Q_{k,s}$  визначені наступними рекурентними співвідношеннями:

$$Q_{2,s} := T_s, \quad Q_{k,s} := \sum_{r=k-2}^{s-1} Q_{k-1,r} B_{r,s}, \quad k = 3, 4, \dots, s+1.$$

при

$$T_s := ya_s + zb_s, \quad B_{r,s} := \sum_{k=1}^{s-1} T_k \Upsilon_{r,s}^k, \quad s = 2, 3, \dots, n-1.$$

Із співвідношень (4.2) випливає, що точки  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ , які відповідають необоротним елементам  $\zeta \in \mathbb{A}_n$ , лежать на прямих

$$L : \begin{cases} x + y \operatorname{Re} a_0 + z \operatorname{Re} b_0 = 0, \\ y \operatorname{Im} a_0 + z \operatorname{Im} b_0 = 0 \end{cases}$$

в просторі  $\mathbb{R}^3$ .

Нехай область  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$  опукла в напрямку прямої  $L$ . Позначимо

$$D := \{\xi = x + ya_0 + zb_0 \in \mathbb{C} : \zeta = x + ye_2 + ze_3 \in \Omega_\zeta\}.$$

**Теорема 4.1.** [9] *Нехай область  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$  опукла в напрямку прямої  $L$  і нехай хоча б одне з чисел  $a_0$  чи  $b_0$  належить  $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ . Тоді кожна моногенна функція  $\Phi : \Omega_\zeta \rightarrow \mathbb{A}_n$  подається у вигляді*

$$\Phi(\zeta) = \sum_{k=0}^{n-1} I_k \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} F_k(t) (t - \zeta)^{-1} dt, \quad (4.3)$$

де  $F_k$  — деяка голоморфна функція в області  $D$ , а  $\Gamma$  — замкнена жорданова спрямлювана крива, яка лежить в області  $D$  і охоплює точку  $\xi$ .

Оскільки за умов теореми 4.1 кожна моногенна функція  $\Phi : \Omega_\zeta \rightarrow \mathbb{A}_n$  продовжується до функції, моногенної в нескінченному циліндрі

$$\Pi_\zeta := \{\zeta \in E_3 : \xi \in D\},$$

то надалі будемо розглядати моногенні функції  $\Phi$ , визначені в областях виду  $\Pi_\zeta$ . Відмітимо, що циліндр  $\Pi := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \zeta \in \Pi_\zeta\}$  паралельний прямій  $L$ .

В наступній теоремі встановлюється зв'язок між моногенними функціями в алгебрі виду  $\mathbb{A}_n$  і моногенними функціями в її довільному розширенні  $\mathbb{E}(\mathbb{A}_n)$ . Для формулювання результату введемо деякі позначення.

Нехай вектори  $1, \tilde{e}_2, \tilde{e}_3$  алгебри  $\mathbb{E}(\mathbb{A}_n)$  задовольняють характеристичне рівняння (1.3). На ці вектори натягнемо лінійний простір

$$\tilde{E}_3 := \{\tilde{\zeta} = x + y\tilde{e}_2 + z\tilde{e}_3 : x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

В алгебрі  $\mathbb{A}_n$  будемо розглядати трійку  $1, \tilde{P}(\tilde{e}_2), \tilde{P}(\tilde{e}_3)$  і лінійний простір

$$\tilde{P}(\tilde{E}_3) := \{\zeta = x + y\tilde{P}(\tilde{e}_2) + z\tilde{P}(\tilde{e}_3) : x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

**Теорема 4.2.** *Нехай вектори  $1, \tilde{e}_2, \tilde{e}_3$  виду (4.1) алгебри  $\mathbb{E}(\mathbb{A}_n)$  задовольняють характеристичне рівняння (1.3) і нехай хоча б одне з чисел  $a_0$  чи  $b_0$  належить  $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ . Крім того, нехай функція  $\tilde{\Phi} : \tilde{\Pi}_\zeta \rightarrow \mathbb{E}(\mathbb{A}_n)$  змінної  $\tilde{\zeta} = x + y\tilde{e}_2 + z\tilde{e}_3$  моногенна в деякому циліндрі  $\tilde{\Pi}_\zeta \subset \tilde{E}_3$ . Тоді в алгебрі  $\mathbb{A}_n$  трійка векторів  $1, \tilde{P}(\tilde{e}_2), \tilde{P}(\tilde{e}_3)$  також задовольняє характеристичне рівняння (1.3), а функція  $\Phi(\zeta) := \tilde{P}(\tilde{\Phi}(\tilde{\zeta}))$  є моногенною в циліндрі  $\Pi_\zeta := \{\zeta \in \tilde{P}(\tilde{E}_3) : \tilde{\zeta} \in \tilde{\Pi}_\zeta\}$  алгебри  $\mathbb{A}_n$ .*

**Доведення.** Той факт, що вектори  $1, \tilde{P}(\tilde{e}_2), \tilde{P}(\tilde{e}_3)$  задовольняють характеристичне рівняння (1.3) випливає з наслідку 3.14. Тепер зауважимо, що з тотожності (3.5) випливає тотожність

$$(t - \zeta)^{-1} = \tilde{P}\left((t - \tilde{\zeta})^{-1}\right) \quad \forall t \in \mathbb{C} : t \neq x + ya_0 + zb_0. \quad (4.4)$$

За теоремою **A** функція  $\tilde{\Phi}$  подається у вигляді

$$\tilde{\Phi}(\tilde{\zeta}) = \sum_{k=0}^n \tilde{I}_k \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \tilde{F}_k(t) (t - \tilde{\zeta})^{-1} dt. \quad (4.5)$$



Подіємо на рівність (4.5) оператором  $\tilde{P}$ . Враховуючи співвідношення (3.9) і (4.4), маємо

$$\begin{aligned}\tilde{P}(\tilde{\Phi}(\tilde{\zeta})) &= \sum_{k=0}^n \tilde{P}(\tilde{I}_k) \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \tilde{F}_k(t) \tilde{P}((t - \tilde{\zeta})^{-1}) dt = \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} I_k \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \tilde{F}_k(t) (t - \zeta)^{-1} dt.\end{aligned}$$

Відповідно до теореми **A** отримана функція  $\tilde{P}(\tilde{\Phi}(\tilde{\zeta}))$  є моногенною в циліндрі  $\Pi_{\zeta} := \{\zeta \in \tilde{P}(\tilde{E}_3) : \tilde{\zeta} \in \tilde{\Pi}_{\zeta}\}$ .  $\square$

**Зауваження 4.3.** Теорема 4.2 стверджує, що для вивчення моногенних функцій в алгебрах виду  $\mathbb{A}_n$  при  $n = 2, 3, 4, 5$  достатньо обмежитись дослідженням моногенних функцій у певних дев'яти алгебрах (які є нульовими розширеннями алгебр виду  $\mathbb{A}_5$ ) виду  $\mathbb{A}_6$ .

Крім того, теорема 4.2 означає, що клас розв'язків рівняння (1.1) (і взагалі кажучи, рівняння (2.6)) у вигляді компонент моногенних функцій буде тим ширший чим більша розмірність алгебри виду  $\mathbb{A}_n$ . Або точніше: якщо комплекснозначний розв'язок  $U(x, y, z)$  рівняння (1.1) є деякою компонентою моногенної функції в деякій алгебрі  $\mathbb{A}_n$  при  $n < N$ , то серед алгебр виду  $\mathbb{A}_N$  існує алгебра  $\mathbb{A}$  і існує моногенна функція  $\Phi$  в  $\mathbb{A}$  така, що  $U(x, y, z)$  є деякою компонентою функції  $\Phi$ . При цьому  $N$  може бути як завгодно великим.

**Приклад 4.4.** Розглянемо моногенні функції в алгебрі  $\mathbb{B}$  і в її розширенні  $\mathbb{A}_3(\alpha)$ . В алгебрі  $\mathbb{B}$  кожна моногенна функція подається у вигляді

$$\Phi(\zeta) = F(\xi) + (\xi_1 F'(\xi) + F_0(\xi)) I_1, \quad \zeta = \xi + \xi_1 I_1.$$

А з прикладу 3.11 і теореми **A** випливає, що кожна моногенна функція в алгебрі  $\mathbb{A}_3(\alpha)$  подається у такому вигляді:

$$\begin{aligned}\tilde{\Phi}(\tilde{\zeta}) &= F(\xi) + (\xi_1 F'(\xi) + F_0(\xi)) \tilde{I}_1 + \\ &+ \left( \xi_2 F'(\xi) + \frac{\xi^2 \alpha}{2} F''(\xi) + \xi_1 F_0'(\xi) + F_1(\xi) \right) \tilde{I}_2, \\ \tilde{\zeta} &= \xi + \xi_1 \tilde{I}_1 + \xi_2 \tilde{I}_2.\end{aligned}$$

Якщо в  $\tilde{\Phi}(\tilde{\zeta})$  покласти  $\xi_2 = 0$ , відкинути компоненту при  $\tilde{I}_2$  і  $\tilde{I}_1$  ототожнити з  $I_1$ , то з  $\tilde{\Phi}(\tilde{\zeta})$  отримаємо  $\Phi(\zeta)$ , тобто моногенну функцію в звуженні  $\mathbb{B}$ .

**Зауваження 4.5.** Теорема 4.2 залишається справедливою для моногенних функцій змінної  $\zeta = x_1e_1 + x_2e_2 + \dots + x_de_d$  при  $x_1, x_2, \dots, x_d \in \mathbb{R}$ ,  $e_1, e_2, \dots, e_d \in \mathbb{E}(\mathbb{A}_n)$ .

#### ЛІТЕРАТУРА

- [1] E. Cartan. Les groupes bilinéaires et les systèmes de nombres complexes. *Annales de la faculté des sciences de Toulouse*, 12(1):1–64, 1898.
- [2] S. V. Grishchuk, S. A. Plaksa. Monogenic functions in a biharmonic algebra. *Ukr. Math. J.*, 61(12):1865–1876, 2009.
- [3] P. W. Ketchum. Analytic functions of hypercomplex variables. *Trans. Amer. Math. Soc.*, 30(2):641–667, 1928.
- [4] I. P. Mel'nichenko. The representation of harmonic mappings by monogenic functions. *Ukr. Math. J.*, 27(5):599–505, 1975.
- [5] S. A. Plaksa, V. S. Shpakovskii. Constructive description of monogenic functions in a harmonic algebra of the third rank. *Ukr. Math. J.*, 62(8):1251–1266, 2011.
- [6] A. Pogorui, R. M. Rodriguez-Dagnino, M. Shapiro. Solutions for pdes with constant coefficients and derivability of functions ranged in commutative algebras. *Math. Meth. Appl. Sci.*, 37(17):2799–2810, 2014.
- [7] M. N. Roşculeţ. Algebre infinite asociate la ecuaţii cu derivate parţiale, omogene, cu coeficienţi constanţi de ordin oarecare. *Studii şi Cercetări Matematice*, 6(3-4):567–643, 1955.
- [8] M. N. Roşculeţ. Algebre infinite, comutative, asociate la sisteme de ecuaţii cu derivate parţiale. *Studii şi Cercetări Matematice*, 7(3-4):321–371, 1956.
- [9] V. S. Shpakivskyi. Constructive description of monogenic functions in a finite-dimensional commutative associative algebra. *Adv. Pure Appl. Math.*, 7(1):63–75, 2016.
- [10] В. Шпаковский. Гиперкомплексные функции и точные решения одного уравнения гидродинамики. *Зб. праць Ін-ту математики НАН України*, 14(1):262–274, 2017.
- [11] В. С. Шпаківський. Про моногенні функції, визначені в різних комутативних алгебрах. *Прийнято до друку в Укр. мат. вісник*, arXiv:1803.03938v1.

Надійшла до редакції 9 квітня 2018, прийнята до друку 20 серпня 2018.

В. С. Шпаківський

ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ НАН УКРАЇНИ

Email: shpakivskyi86@gmail.com